

**Oceňovacie tabuľky pre poistenie trvalých následkov úrazu**

| Pora-dové číslo | TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU PODĽA DRUHU A ROZSAHU   | PERCENTO PLNENIA |
|-----------------|---|------------------|
|                 | Úrazy hlavy a zmyslových orgánov  |                  |
| 1.1             | Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm <sup>2</sup>  | 3 % - 15 %       |
| 1.2             | Úplný defekt v lebečnej klenbe v rosahu nad 10 cm <sup>2</sup>  | 16 % - 25 %      |
| 1.3             | Subjektívne ľažkosti bez objektívneho nálezu po zraneniaciach hlavy dokumentované ošetrujúcim lekárom                                 | 1 % - 10 %       |
| 1.4             | Vážne mozgové alebo duševné poruchy po ľažkam poranení hlavy podľa stupňa   | 30 % - 100 %     |
| 1.5             | Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa a stredného stupňa   | 1 % - 10 %       |
| 1.6             | Traumatická porucha tvárového nervu ľažkého stupňa  | 11 % - 15 %      |
| 1.7             | Traumatické poškodenie trojklaného nervu podľa stupňa poškodenia  | 3 % - 15 %       |
| 1.8             | Jazvy na tvári a poškodenie tváre vzbudzujúce súcit, alebo ošklivosť sprevádzané príp. funkčnými poruchami ľahkého a stredného stupňa | 1 % - 15 %       |
| 1.9             | Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť ľažkého stupňa                              | 16 % - 35 %      |
| 1.10            | Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvororea) objektívne dokumentovaná   | 5 % - 25 %       |
|                 | Poškodenie nosa alebo čchu  |                  |
| 1.11            | Strata hrotu nosa   | 2 % - 10 %       |
| 1.12            | Strata celého nosa bez zúženia  | 15 % - 20 %      |
| 1.13            | Strata celého nosa so zúžením   | 21 % - 25 %      |
| 1.14            | Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti  | 1 % - 10 %       |
| 1.15            | Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení  | 1 % - 10 %       |
| 1.16            | Perforácia nosovej priečradky   | 0,5 % - 5 %      |
| 1.17            | Chronický hnisavý pourazový zápal vedľajších nosových dutín   | 1 % - 10 %       |
| 1.18            | Strata čchu a chuti   | 5 % - 15 %       |
|                 | Poškodenie očí alebo zraku  |                  |
| 1.19            | Úplná slepota oka   | 25 %             |
| 1.20            | Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k hodnoteniu za úplnú slepotu oka   | 5 %              |
| 1.21            | Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášanlivosti kontaknej šošovky aspoň 4 hodiny denne                    | 15 %             |
| 1.22            | Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri znášanlivosti kontaknej šošovky menej než 4 hodiny denne.               | 20 %             |
| 1.23            | Strata šošovky na jednom oku (vrátane poruchy akomodácie) pri úplnej neznášanlivosti kontaknej šošovky                                | 25 %             |
| 1.24            | Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s afakickou korekciou horšia než 6/12                | 15 %             |

|      |   |              |
|------|---|--------------|
| 1.25 | Traumatická porucha nervov alebo porucha rovnováhy okohybnných svalov podľa stupňa  | 5 % - 25 %   |
| 1.26 | Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku čiastočne   | 0,5 % - 4 %  |
| 1.27 | Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku úplne   | 4,5 % - 8 %  |
| 1.28 | Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach čiastočne   | 1 % - 8 %    |
| 1.29 | Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach úplne   | 8,5 % - 15 % |
| 1.30 | Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku   | 0,5 % - 5 %  |
| 1.31 | Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach   | 5,5 % - 10 % |
| 1.32 | Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) podľa stupňa   | 0,5 % - 5 %  |
| 1.33 | Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vizu, ktorá sa hodnotí osobitne) pre každe oko | 2 % - 5 %    |
| 1.34 | Traumatická porucha akomodácie jednostranná do 45 rokov   | 1 % - 5 %    |
| 1.35 | Traumatická porucha akomodácie obojstranná do 45 rokov  | 1 % - 8 %    |
| 1.36 | Traumatická porucha akomodácie jednostranná po 45 rokoch  | 1 % - 3 %    |
| 1.37 | Traumatická porucha akomodácie obojstranná po 45 rokoch   | 1 % - 5 %    |
| 1.38 | Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, jednostranný  | 3 % - 10 %   |
| 1.39 | Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, obojstranný   | 6 % - 15 %   |
| 1.40 | Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná   | 5 % - 20 %   |
| 1.41 | Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná  | 21 % - 60 %  |
| 1.42 | Chronická uveitída (sympatická ophtalmia) po dokázateľnom úrave oka (podľa ostrosti zraku)  | 10 % - 25 %  |
|      | Poškodenie uší alebo sluchu   |              |
| 1.43 | Strata jednej ušnice  | 5 % - 10 %   |
| 1.44 | Strata oboch ušníc  | 11 % - 20 %  |
| 1.45 | Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie   | 0,5 % - 5 %  |
| 1.46 | Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu  | 3 % - 15 %   |
| 1.47 | Deformácia ušnice sa hodnotí podľa bodov 1.8 a 1.9  |              |
| 1.48 | Nahluchlosť jednostranná ľahkého a stredného stupňa   | 1 % - 7 %    |
| 1.49 | Nahluchlosť jednostranná ľažkého stupňa   | 8 % - 12 %   |
| 1.50 | Nahluchlosť obojstranná ľahkého a stredného stupňa  | 5 % - 20 %   |
| 1.51 | Nahluchlosť obojstranná ľažkého stupňa  | 21 % - 35 %  |

|      |  |               |
|------|--|---------------|
| 1.52 | Strata sluchu jedného ucha   | 15 %          |
| 1.53 | Strata sluchu oboch uší  | 40 %          |
| 1.54 | Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa  | 5 % - 20 %    |
| 1.55 | Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa   | 21 % - 50 %   |
|      | Poškodenie chrupu  |               |
| 1.56 | Za stratu jedného zuba   | 1 %           |
| 1.57 | Za stratu každého ďalšieho zuba  | 1 %           |
| 1.58 | Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba   | 0,5 %         |
| 1.59 | Za deformáciu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov   | do 5 %        |
|      | Poškodenie jazyka  |               |
| 1.60 | Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokial' sa už nehodnotia podľa bodov 1.65 až 1.68      | 5 % - 15 %    |
|      | Úraz krku  |               |
| 1.61 | Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa  | 5 % - 15 %    |
| 1.62 | Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa  | 16 % - 30 %   |
| 1.63 | Zúženie hrtana alebo priedušnice ľažkého stupňa  | 31 % - 65 %   |
| 1.64 | Úplná strata hrtana  | 80 %          |
| 1.65 | Čiastočná strata hlasu   | 3 % - 20 %    |
| 1.66 | Strata hlasu (afónia)  | 25 %          |
| 1.67 | Staženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov   | 5 % - 20 %    |
| 1.68 | Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov   | 30 %          |
| 1.69 | Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanyluou   | 50 %          |
|      | Úrazy hrudníka, plúc, srdca a pažeráka   |               |
| 1.70 | Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty plúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ľahkého stupňa, bez prejavov dychovej nedostatočnosti | 0,5 % - 10 %  |
| 1.71 | Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty plúc a hrudníkovej steny klinicky overené, stredného stupňa, s prejavmi dychovej nedostatočnosti | 10,5 % - 20 % |
| 1.72 | Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty plúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ľažkého stupňa, s prajavmi dychovej nedostatočnosti   | 20,5 % - 30 % |
| 1.73 | Iné následky poranenia plúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu jednostranné  | 5 % - 40 %    |
| 1.74 | Iné následky poranenia plúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu obojstranné   | 20 % - 80 %   |
| 1.75 | Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa porušenia funkcie                                     | 20 % - 80 %   |
| 1.76 | Fistula pažeráka po úrade pokial' sa nedá riešiť rekonštrukciou  | 20 % - 40 %   |
| 1.77 | Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa  | 3 % - 10 %    |
| 1.78 | Poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa  | 11 % - 20 %   |
| 1.79 | Poúrazové zúženie pažeráka ľažkého stupňa  | 21 % - 60 %   |

|       |   |             |
|-------|---|-------------|
|       | Úrazy brucha a tráviacich orgánov   |             |
| 1.80  | Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného listu   | 1 % - 20 %  |
| 1.81  | Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy  | 5 % - 100 % |
| 1.82  | Strata sleziny - do 18. roku  | 25 %        |
| 1.83  | Strata sleziny - po 18. roku  | 15 %        |
| 1.84  | Strata časti sleziny, podľa závažnosti poruchy funkcie  | do 15 %     |
| 1.85  | Sterkorálna fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí, pokial' sa nedá riešiť chirurgicky               | 20 % - 50 % |
| 1.86  | Nedovieravosť analných zvieračov čiastočná  | 5 % - 20 %  |
| 1.87  | Nedovieravosť analných zvieračov úplná  | 30 % - 60 % |
| 1.88  | Poúrazové zúženie konečníka alebo analného kanála, ľahkého alebo stredného stupňa                           | 3 % - 20 %  |
| 1.89  | Poúrazové zúženie konečníka alebo analného kanála, ľažkého stupňa   | 21 % - 50 % |
|       | Úrazy močových a pohlavných ústrojov  |             |
| 1.90  | Strata jednej obličky   | 40 %        |
| 1.91  | Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotej infekcie ľahkého a stredného stupňa | 5 % - 20 %  |
| 1.92  | Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest vrátane druhotej infekcie ľažkého stupňa             | 21 % - 50 % |
| 1.93  | Fistula močového mechúra alebo močovej rúry (nemožno súčasne hodnotiť podľa 1.91 a 1.92)                    | 10 % - 50 % |
| 1.94  | Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek  | 10 % - 50 % |
| 1.95  | Hydrokéla po úrade  | 0,5 % - 5 % |
| 1.96  | Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) do 45 rokov               | 10 %        |
| 1.97  | Strata jedného semenníka (pri kryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) nad 45 rokov              | 5 %         |
| 1.98  | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov   | 35 %        |
| 1.99  | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 45 rokov  | 20 %        |
| 1.100 | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov  | 15 % - 40 % |
| 1.101 | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 45 rokov   | 5 % - 20 %  |
| 1.102 | Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov   | 15 % - 40 % |
|       | Úrazy chrbotovej kosti a miechy   |             |
| 1.103 | Obmedzenie hybnosti chrbotovej kosti ľahkého stupňa   | 5 % - 10 %  |
| 1.104 | Obmedzenie hybnosti chrbotovej kosti stredného stupňa   | 11 % - 20 % |

|       |  |               |       |  |             |
|-------|--|---------------|-------|--|-------------|
| 1.105 | Obmedzenie hybnosti chrbovej kosti ľažkého stupňa  | 21 % - 35 %   | 1.124 | Paklív ramennej kosti, vpravo  | 40 %        |
| 1.106 | Poúrazové poškodenie chrbovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého a stredného stupňa                           | 10 % - 40 %   | 1.125 | Paklív ramennej kosti, vľavo   | 35 %        |
| 1.107 | Poúrazové poškodenie chrbovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľažkého stupňa                                       | 41 % - 100 %  | 1.126 | Chronický zápal kostnej dreny len po otvorených zlomeninách alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu v čase vyšetrenia aktívny, vpravo  | 30 %        |
| 1.108 | Poúrazové poškodenie chrbovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, avšak s trvalými subjektívnymi ľažkostami preukázanými lekárskym pozorovaním | 1 % - 15 %    | 1.127 | Chronický zápal kostnej dreny len po otvorených zlomeninách alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu v čase vyšetrenia aktívny, vľavo   | 25 %        |
|       | Úrazy panvy  |               | 1.128 | Nenapravené sternoklavikulárne vykľbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo   | 3 %         |
| 1.109 | Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbovej kosti a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov  | 10 % - 65 %   | 1.129 | Nenapravené sternoklavikulárne vykľbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo  | 2 %         |
| 1.110 | Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbovej kosti a funkcie dolných končatín u žien nad 45 rokov   | 5 % - 50 %    | 1.130 | Nenapravené akromioklavikulárne vykľbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného klíbu, vpravo  | 6 %         |
| 1.111 | Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbovej kosti a funkcie dolných končatín u mužov   | 5 % - 50 %    | 1.131 | Nenapravené akromioklavikulárne vykľbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného klíbu, vľavo   | 5 %         |
|       | Úrazy horných končatín (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)  |               | 1.132 | Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhľavého svalu pri neporušenej funkcií ramenného a laktového klíbu, vpravo  | 3 %         |
| 1.112 | Strata hornej končatiny v ramennom klíbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným klíbom, vpravo  | 60 %          | 1.133 | Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhľavého svalu pri neporušenej funkcií ramenného a laktového klíbu, vľavo   | 2 %         |
| 1.113 | Strata hornej končatiny v ramennom klíbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným klíbom, vľavo   | 50 %          |       | Poškodenie v oblasti laktového klíbu a predlaktia (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)   |             |
| 1.114 | Úplná meravosť ramenného klíbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vpravo  | 35 %          | 1.134 | Úplná meravosť laktového klíbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo   | 30 %        |
| 1.115 | Úplná meravosť ramenného klíbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vľavo   | 30 %          | 1.135 | Úplná meravosť laktového klíbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo  | 25 %        |
| 1.116 | Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vpravo                            | 30 %          | 1.136 | Úplná meravosť laktového klíbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90° až 95°), vpravo   | 20 %        |
| 1.117 | Meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50° až 70°, predpaženie 40° až 45° a vnútorná rotácia 20°), vľavo                             | 25 %          | 1.137 | Úplná meravosť laktového klíbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90° až 95°), vľavo  | 15 %        |
| 1.118 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného klíbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vpravo   | 0,4 % - 5 %   | 1.138 | Obmedzenie pohyblivosti laktového klíbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo   | 2 % - 12 %  |
| 1.119 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného klíbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135°), vľavo  | 0,2 % - 4 %   | 1.139 | Obmedzenie pohyblivosti laktového klíbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo  | 1 % - 10 %  |
| 1.120 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného klíbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vpravo   | 5,5 % - 10 %  | 1.140 | Obmedzenie pohyblivosti laktového klíbu ľažkého stupňa, vpravo   | 13 % - 18 % |
| 1.121 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného klíbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135°), vľavo  | 4,5 % - 8 %   | 1.141 | Obmedzenie pohyblivosti laktového klíbu ľažkého stupňa, vľavo  | 11 % - 16 % |
| 1.122 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného klíbu ľažkého stupňa (vzpaženie do 90°), vpravo  | 10,5 % - 18 % | 1.142 | Úplná meravosť radioulárných klíbov (s nemožnosťou privŕtenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronáčii alebo supinácii v krajnom odvrátení privŕtení), vpravo | 20 %        |
| 1.123 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného klíbu ľažkého stupňa (vzpaženie do 90°), vľavo   | 8,5 % - 15 %  | 1.143 | Úplná meravosť radioulárných klíbov (s nemožnosťou privŕtenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronáčii alebo supinácii v krajnom odvrátení privŕtení), vľavo  | 15 %        |

|       |  |               |   |  |             |
|-------|--|---------------|---|--|-------------|
| 1.144 | Úplná meravosť radioulnárnych kŕbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo   | 1 % - 15 %    | 1.172   | Paklb člnkovitej kosti, vpravo   | 15 %        |
| 1.145 | Úplná meravosť radioulnárnych kŕbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo  | 1 % - 10 %    | 1.173   | Paklb člnkovitej kosti, vľavo  | 13 %        |
| 1.146 | Obmedzenie privŕtenia a odvrátenia predlaktia ľahkého a stredného stupňa, vpravo   | 0,5 % - 10 %  | 1.174   | Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stredného stupňa, vpravo  | 1 % - 12 %  |
| 1.147 | Obmedzenie privŕtenia a odvrátenia predlaktia ľahkého a stredného stupňa, vľavo  | 0,3 % - 8 %   | 1.175   | Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého a stredného stupňa, vľavo   | 1 % - 10 %  |
| 1.148 | Obmedzenie privŕtenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vpravo   | 10,5 % - 15 % | 1.176   | Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vpravo  | 13 % - 18 % |
| 1.149 | Obmedzenie privŕtenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vľavo  | 8,5 % - 12 %  | 1.177   | Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vľavo   | 11 % - 15 % |
| 1.150 | Paklb oboch kostí predlaktia, vpravo   | 40 %          | Poškodenie palca (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák) |  |             |
| 1.151 | Paklb oboch kostí predlaktia, vľavo  | 35 %          | 1.178   | Strata koncového článku palca, vpravo  | 9 %         |
| 1.152 | Paklb vretennej kosti, vpravo  | 25 %          | 1.179   | Strata koncového článku palca, vľavo   | 7 %         |
| 1.153 | Paklb vretennej kosti, vľavo   | 20 %          | 1.180   | Strata palca so záprstnou kostou, vpravo   | 25 %        |
| 1.154 | Paklb laktóvej kosti, vpravo   | 15 %          | 1.181   | Strata palca so záprstnou kostou, vľavo  | 20 %        |
| 1.155 | Paklb laktóvej kosti, vľavo  | 10 %          | 1.182   | Strata oboch článkou palca, vpravo   | 18 %        |
| 1.156 | Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniacach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, v čase hodnotenia aktívny, vpravo | 25 %          | 1.183   | Strata oboch článkou palca, vľavo  | 15 %        |
| 1.157 | Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniacach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, v čase hodnotenia aktívny, vľavo  | 20 %          | 1.184   | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo                              | 8 %         |
| 1.158 | Kývavý laktový kĺb, vpravo   | 5 % - 30 %    | 1.185   | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo                               | 6 %         |
| 1.159 | Kývavý laktový kĺb, vľavo  | 3 % - 25 %    | 1.186   | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení vo vystretí (v hyperextenzii), vpravo                 | 7 %         |
| 1.160 | Strata predlaktia pri zachovanom laktóvom kĺbe, vpravo   | 55 %          | 1.187   | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení vo vystretí (v hyperextenzii), vľavo                  | 6 %         |
| 1.161 | Strata predlaktia pri zachovanom laktóvom kĺbe, vľavo  | 45 %          | 1.188   | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo                               | 0,4 % - 6 % |
|       | Strata alebo poškodenie ruky (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)  |               | 1.189   | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo                                | 0,3 % - 5 % |
| 1.162 | Strata ruky v zápästí, vpravo  | 50 %          | 1.190   | Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo   | 1 % - 6 %   |
| 1.163 | Strata ruky v zápästí, vľavo   | 45 %          | 1.191   | Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo  | 0,6 % - 5 % |
| 1.164 | Strata všetkých prstov ruky, včítane záprstných kostí vpravo   | 50 %          | 1.192   | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vpravo           | 9 %         |
| 1.165 | Strata všetkých prstov ruky, včítane záprstných kostí vľavo  | 45 %          | 1.193   | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo addukcia), vľavo            | 7 %         |
| 1.166 | Strata prstov ruky okrem palca, vpravo   | 40 %          | 1.194   | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo                            | 1 % - 6 %   |
| 1.167 | Strata prstov ruky okrem palca, vľavo  | 35 %          | 1.195   | Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo                             | 0,6 % - 5 % |
| 1.168 | Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo postaveniach jemu blízkych (úplné chrbotové alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo   | 30 %          | 1.196   | Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vpravo | 3 %         |
| 1.169 | Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo postaveniach jemu blízkych (úplné chrbotové alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo  | 25 %          | 1.197   | Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vľavo  | 2 %         |
| 1.170 | Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbotové ohnutie 20° až 40°), vpravo  | 5 % - 20 %    | 1.198   | Úplná meravosť všetkých kŕbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo   | 20 %        |
| 1.171 | Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (chrbotové ohnutie 20° až 40°), vľavo   | 3 % - 17 %    | 1.199   | Úplná meravosť všetkých kŕbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo  | 18 %        |

|       |  |             |       |   |              |
|-------|--|-------------|-------|---|--------------|
| 1.200 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kľbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo     | 0,3 % - 4 % | 1.224 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo   | 0,2 % - 4 %  |
| 1.201 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kľbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo      | 0,2 % - 3 % | 1.225 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo  | 0,1 % - 3 %  |
| 1.202 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kľbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo     | 4,5 % - 6 % | 1.226 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo   | 4,5 % - 8 %  |
| 1.203 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kľbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo      | 3,5 % - 5 % | 1.227 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo  | 3,5 % - 6 %  |
| 1.204 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kľbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo          | 0,2 % - 4 % | 1.228 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vpravo   | 8,5 % - 10 % |
| 1.205 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kľbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo           | 0,1 % - 3 % | 1.229 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vľavo  | 6,5 % - 8 %  |
| 1.206 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kľbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo          | 4,5 % - 6 % | 1.230 | Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kľbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcií, vpravo                                | 2 %          |
| 1.207 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kľbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo           | 3,5 % - 5 % | 1.231 | Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kľbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcií, vľavo                                 | 1 %          |
| 1.208 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kľbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo | 1 % - 6 %   | 1.232 | Nemožnosť úplného vystretia základného kľbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo   | 3 %          |
| 1.209 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kľbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo  | 0,6 % - 5 % | 1.233 | Nemožnosť úplného vystretia základného kľbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo  | 2 %          |
| 1.210 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kľbu ľahkého a stredného stupňa, vpravo | 6,5 % - 9 % |       | Poškodenie prostredníka, prsteníka a malíčka (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)   |              |
| 1.211 | Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kľbu ľahkého a stredného stupňa, vľavo  | 5,5 % - 7 % | 1.234 | Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kostou, vpravo   | 9 %          |
|       | Poškodenie ukazováka (zohľadňuje sa, či je poistený pravák alebo ľavák)  |             | 1.235 | Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kostou, vľavo  | 7 %          |
| 1.212 | Strata koncového článku ukazováka, vpravo  | 4 %         | 1.236 | Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kľbu, vpravo  | 9 %          |
| 1.213 | Strata koncového článku ukazováka, vľavo   | 3 %         | 1.237 | Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kľbu, vľavo   | 7 %          |
| 1.214 | Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo   | 8 %         | 1.238 | Strata dvoch článkov prsta, vpravo  | 5 %          |
| 1.215 | Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo  | 6 %         | 1.239 | Strata dvoch článkov prsta, vľavo   | 4 %          |
| 1.216 | Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo  | 12 %        | 1.240 | Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo   | 3 %          |
| 1.217 | Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo   | 10 %        | 1.241 | Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo  | 2 %          |
| 1.218 | Strata ukazováka so záprstnou kostou, vpravo   | 15 %        | 1.242 | Úplná meravosť všetkých troch kľbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí, vpravo  | 8 %          |
| 1.219 | Strata ukazováka so záprstnou kostou, vľavo  | 12 %        | 1.243 | Úplná meravosť všetkých troch kľbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcií susedných prstov), vľavo | 6 %          |
| 1.220 | Úplná meravosť všetkých troch kľbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo   | 10 %        | 1.244 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo   | 0,1 % - 2 %  |
| 1.221 | Úplná meravosť všetkých troch kľbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo  | 8 %         | 1.245 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo  | 0,1 % - 1 %  |
| 1.222 | Úplná meravosť všetkých troch kľbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo   | 12 %        |       |   |              |
| 1.223 | Úplná meravosť všetkých troch kľbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo  | 10 %        |       |   |              |

|  |   |              |       |  |               |
|--|---|--------------|-------|--|---------------|
| 1.246  | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo                     | 2,5 % - 5 %  | 1.276 | Lézia distálnej časti nervu radialis oblast' ruky, vľavo   | 4 % - 20 %    |
| 1.247  | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo                      | 1,5 % - 4 %  | 1.277 | Izolovaná porucha (lézia) citlivosti nervi radialis, obojstranne   | 0,5 % - 7 %   |
| 1.248  | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vpravo                 | 5,5 % - 6 %  |       | Úrazy dolných končatín   |               |
| 1.249  | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac než 4 cm, vľavo                  | 4,5 % - 5 %  | 1.278 | Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom   | 50 %          |
| 1.250  | Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcií prsta, vpravo | 2 %          | 1.279 | Paklb stehbovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice  | 40 %          |
| 1.251  | Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcií prsta, vľavo  | 1 %          | 1.280 | Čiastočná endoprotéza bedrového kĺbu + možné hodnotiť pohyblivosť kĺbu, spolu však nesmie presiahnuť % plnenia za TEP  | 8 %           |
| 1.252  | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo                                 | 2 %          | 1.281 | Totálna endoprotéza (TEP) bedrového kĺbu   | 15 %          |
| 1.253  | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo                                  | 1 %          | 1.282 | Aktívny chronický zápal kostnej drene stehbovej kosti len po otvorených zraneniacach alebo po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované Rtg.                        | 25 %          |
| Traumatické poškodenia nervov hornej končatiny |   |              | 1.283 | Skrátenie dolnej končatiny od 1 cm do 4 cm   | do 5 %        |
| 1.254  | Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vpravo   | 10 % - 60 %  | 1.284 | Skrátenie dolnej končatiny do 6 cm   | 5,5 % - 10 %  |
| 1.255  | Úplné porušenie (lézia) plexus brachialis, vľavo  | 8 % - 50 %   | 1.285 | Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm   | 10,5 % - 20 % |
| 1.256  | Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vpravo   | 5 % - 30 %   | 1.286 | Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)   | 40 %          |
| 1.257  | Porušenie (lézia) plexus brachialis horný typ, vľavo  | 4 % - 25 %   | 1.287 | Úplná meravosť bedrového kĺbu v priaznivom postavení (lahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)  | 5 % - 30 %    |
| 1.258  | Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vpravo   | 5 % - 40 %   | 1.288 | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého a stredného stupňa  | 3 % - 15 %    |
| 1.259  | Porušenie (lézia) plexus brachialis dolný typ, vľavo  | 3 % - 30 %   | 1.289 | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ďažkého stupňa  | 16 % - 25 %   |
| 1.260  | Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vpravo  | 5 % - 25 %   |       | Poškodenie kolena  |               |
| 1.261  | Úplná porucha (lézia) nervus axillaris, vľavo   | 4 % - 20 %   | 1.290 | Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°)  | 10 % - 30 %   |
| 1.262  | Izolovaná porucha (lézia) nervus cutaneus brachii radialis bez mororického deficitu obojstranne               | 1 % - 10 %   | 1.291 | Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°)  | 31 % - 40 %   |
| 1.263  | Porucha nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), vpravo  | 2 % - 15 %   | 1.292 | Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení   | 5 % - 25 %    |
| 1.264  | Porucha nervus thoracicus (dlhý hrudný nerv), vľavo   | 1 % - 10 %   | 1.293 | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého a stredného stupňa  | 3 % - 15 %    |
| 1.265  | Porucha (lézia) nervus ulnaris, vpravo  | 5 % - 40 %   | 1.294 | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ďažkého stupňa  | 16 % - 25 %   |
| 1.266  | Porucha (lézia) nervus ulnaris, vľavo   | 3 % - 30 %   | 1.295 | Kývavosť kolenného kĺbu, ľahkého stupňa  | 3 % - 10 %    |
| 1.267  | Porucha (lézia) nervus ulnaris len senzitívnej časti, obojstranne   | 0,5 % - 10 % | 1.296 | Kývavosť kolenného kĺbu, stredného stupňa  | 11 % - 20 %   |
| 1.268  | Traumatická porucha stredového nervu, vpravo (nervus medianus)  | 5 % - 25 %   | 1.297 | Kývavosť kolenného kĺbu, ďažkého stupňa, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, za ktorý sa nepovažuje nákolenica  | 21 % - 30 %   |
| 1.269  | Traumatická porucha stredového nervu, vľavo (nervus medianus)   | 4 % - 20 %   | 1.298 | Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu, inak podľa poruchy funkcie). Ak sa hodnotí porucha funkcie, nemožno podľa tejto Dg. hodnotiť. | 5 %           |
| 1.270  | Porucha nervus musculocu taneus, vpravo   | 3 % - 20 %   | 1.299 | Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu, inak podľa poruchy funkcie). Ak sa hodnotí porucha funkcie, nemožno podľa tejto Dg. hodnotiť.  | 10 %          |
| 1.271  | Porucha nervus musculocu taneus, vľavo  | 2 % - 15 %   |       |  |               |
| 1.272  | Porucha nervus musculocu taneus len senzitívnej časti, obojstranne  | 0,5 % - 7 %  |       |  |               |
| 1.273  | Úplná (lézia) porucha nervu vretenného (radialis), vpravo   | 12 % - 40 %  |       |  |               |
| 1.274  | Úplná (lézia) porucha nervu vretenného (radialis), vľavo  | 10 % - 30 %  |       |  |               |
| 1.275  | Lézia distálnej časti nervu radialis oblast' ruky, vpravo   | 5 % - 25 %   |       |  |               |

|       |   |               |
|-------|---|---------------|
|       | Poškodenie predkolenia  |               |
| 1.300 | Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom  | 45 %          |
| 1.301 | Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným klbom   | 50 %          |
| 1.302 | Pakl pŕšťaly alebo oboch kostí predkolenia  | 45 %          |
| 1.303 | Aktívny chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniacach a po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované Rtg.   | 20 %          |
|       | Poškodenie v oblasti členkového klíbu   |               |
| 1.304 | Strata nohy v členkovom klíbe alebo pod ním   | 40 %          |
| 1.305 | Strata chodidla v Chopartovom klíbe s artrodézou členka   | 30 %          |
| 1.306 | Strata chodidla v Lisfrancovom klíbe alebo pod ním  | 25 %          |
| 1.307 | Úplná meravosť členkového klíbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie)  | 6 % - 30 %    |
| 1.308 | Úplná meravosť členkového klíbu v pravouhlom postavení, alebo jemu blízkom  | 5 % - 25 %    |
| 1.309 | Obmedzenie pohyblivosti členkového klíbu ľahkého a stredného stupňa   | 2 % - 12 %    |
| 1.310 | Obmedzenie pohyblivosti členkového klíbu tăžkého stupňa   | 13 % - 20 %   |
| 1.311 | Obmedzenie pronácie a supinácie nohy  | 2 % - 12 %    |
| 1.312 | Kývavosť členkového klíbu   | 2 % - 12 %    |
| 1.313 | Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy   | 5 % - 25 %    |
| 1.314 | Aktívny chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvorených zraneniacach alebo po operačných zákrokoch nevyhnutných na liečenie následkov úrazu, dokumentované Rtg.                             | 3 % - 15 %    |
|       | Poškodenie v oblasti nohy   |               |
| 1.315 | Strata všetkých prstov nohy   | 18 %          |
| 1.316 | Strata oboch článkov palca nohy   | 10 %          |
| 1.317 | Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou koštou alebo s jej časťou  | 15 %          |
| 1.318 | Strata koncového článku palca nohy  | 3 %           |
| 1.319 | Strata iného prsta nohy, za každý prst  | 2 %           |
| 1.320 | Strata malíčka nohy so záprstnou koštou alebo s jej časťou  | 10 %          |
| 1.321 | Úplná meravosť medzičlánkového klíbu palca nohy   | 3 %           |
| 1.322 | Úplná meravosť základného klíbu palca nohy  | 5 %           |
| 1.323 | Úplná meravosť oboch klíbov palca nohy  | 8 %           |
| 1.324 | Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového klíbu palca nohy  | 0,2 % - 3 %   |
| 1.325 | Obmedzenie pohyblivosti základného klíbu palca nohy   | 0,5 % - 5 %   |
| 1.326 | Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy ako palca, za každý prst   | 0,2 % - 2 %   |
| 1.327 | Poúrazové obejové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine   | 1 % - 10 %    |
| 1.328 | Poúrazové obejové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách   | 5 % - 20 %    |
| 1.329 | Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v klíbe, na stehne nad 2 cm v objeme   | 3,1 % - 5 %   |
| 1.330 | Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v klíbe, na stehne nad 1 cm v objeme   | 0,1 % - 3 %   |
| 1.331 | Porucha (lézie) nervus glutei sup. a interior   | 3 % - 15 %    |
| 1.332 | Porucha nervus obtura torius  | 3 % - 15 %    |
| 1.333 | Senzitívna lézia nervus obturatorius  | 1 % - 7 %     |
| 1.334 | Poúrazová porucha nervus femoralis  | 5 % - 30 %    |
| 1.335 | Senzitívna lézia stehenného nervu   | 1 % - 10 %    |
| 1.336 | Poúrazová porucha nervus ischiadicus (sedací nerv)  | 10 % - 40 %   |
| 1.337 | Senzitívna lézia nervus ischiadicus   | 3 % - 15 %    |
| 1.338 | Nervus tibialis úplná porucha   | 10 % - 30 %   |
| 1.339 | Nervus tibialis distálnej časti s poruchou hybnosti prstov nohy   | 0,5 % - 5 %   |
| 1.340 | Senzitívna porucha nervus tibialis  | 0,3 % - 5 %   |
| 1.341 | Porucha kmeňa nervus fibularis s postihnutím všetkých inervovaných svalov   | 10 % - 30 %   |
| 1.342 | Lézia hlbkovej vetvy ihlicového nervu   | 4 % - 20 %    |
| 1.343 | Lézia povrchovej vetvy ihlicového nervu (len senzitívnej časti)   | 1 % - 10 %    |
|       | Jazvy   |               |
| 1.344 | Rozsiahle plošné jazvy od 1 % do 15 % telesného povrchu, okrem tváre  | 0,5 % - 10 %  |
| 1.345 | Rozsiahle plošné jazvy nad 15 % telesného povrchu   | 10,5 % - 40 % |
| 1.346 | Zvlášť zohyzdľujúce jazvy na exponovaných častiach tela pokiaľ nedosahujú 1% telesného povrchu, exponované časti: krk, dekolt, predlaktia v rámci laktá, ruky, predkolenia v rámci kolena, dorsum nohy. Jazvy na tvári sa hodnotia podľa bodu 1.8 | 0,1 % - 3 %   |

Platné od 1.4.2015